

レジメン : 42030001 食道-5FU/CDDP-4W
 レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルートブライミング/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1袋	●				
002	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1瓶	●				
003	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート 開始から12時まで ソルアセットF輸液 (500mL/袋) (ウーイーンF)	1袋	●				
004	点滴末梢 投与時間：30分 一時点滴：1日1回 点滴速度 106 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 70μ点滴静注ハック*0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1袋 6A	●				
005	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセットF輸液 (500mL/袋) (ウーイーンF)	1袋	● ●				
006	点滴末梢 投与時間：24時間 800mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 24時間 主ルート ピカネイト輸液 (1000ml/袋) フルオロウラシル注	1袋 800 mg/m ²	●	●	●	●	●
007	点滴末梢 投与時間：2時間 80mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6袋 80 mg/m ²	●				
008	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1袋 1A	●				