

レジメン : 42011201 大腸-Bev/FOLFOXIRI-2W

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルートブライミング用/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1袋	●
002	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1瓶	●
003	点滴中心静脈 投与時間：1時間30分 5mg/kg 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 1時間 30分 側管から 2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液100ml (100mL/瓶) アバステン点滴静注用	1瓶 5mg/kg	●
004	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先)投与時間 15分 側管から アキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1袋 6A	●
005	点滴中心静脈 投与時間：1時間 165mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 1時間 主ルート 5%ブドウ糖液(250ml/袋) トボテシン注	1袋 165mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 2時間 側管から エルプラットと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) レボリナート点滴静注用	1袋 200mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 投与時間：2時間 85mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 2時間 主ルート レボリナートと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) エルプラット注	1袋 85mg/m ²	●
008	点滴中心静脈 投与時間：46時間 3200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 46時間 主ルート インフューザーホップ 生理食塩液100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1瓶 3200mg/m ²	●
009	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1筒	●