レジメン : 27010002 卵-Bev/PTX/CBDCA-3W レジメン期間 : 21 ~ 21日

Rp№.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴:1日1回 主ルート		•
	エル ル-ト確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢 投与時間:15分 一時点滴:1日1回	- 7120	•
	点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分		
	側管から 生理食塩液50mL(50mL/瓶) デキサート注射液1.65mg(1.65mg/0.5mL/A)	1 瓶 10 A	
003	ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (ガスター) 点滴末梢 投与時間:30分	1 A	•
	一時点滴: 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分		
	側管から グラニセトロンバッグ3mg(カイトリル)(3mg/100ml/袋)	1 袋	
	点滴末梢 投与時間:3時間 175mg/m ²		•
	一時点滴:1日1回 (優先)投与時間 3時間 側管から		
	生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) パクリタキセル注	1 袋 175 mg/㎡	
005	点滴末梢 投与時間:1時間 5AUC		•
	一時点滴:1日1回 (優先)投与時間 1時間 側管から		
	生理食塩液250ml(250mL/瓶) カルボプラチン注	1 瓶 5 AUC	
006	点滴末梢 一時点滴:1日1回 側管から		•
	アバスチン投与前フラッシュ 生理食塩液20ml (20ml/A)	1 A	
007	点滴末梢 投与時間:1時間30分 15mg/kg		•
	一時点滴:1日1回 (優先)投与時間 1時間 30分 側管から		
	2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液100mⅠ(100mL/瓶)	1 瓶	
	アバスチン注	15 m g /kg	