

レジメン : 42011002 大腸-Bev/XELOX-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用/投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 7.5mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) アバステイン点滴静注用	1 瓶 7.5 mg/kg	●
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 130mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液(250ml/袋) エルプラット注	1 袋 130 mg/m ²	●

【内服抗がん剤併用】 : ゼローダ(2000mg/m²)分2/日 : Day1~14