

レジメン : 27030002 頸-Bev/PTX/CBDCA-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液 50ml (50mL/瓶) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注 20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 瓶 10 A 1 A	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル)	1 袋	●
004	点滴末梢 投与時間 : 3時間 175mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) パクリタキセル注	1 袋 175 mg/m <sup>2</sup>	●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) カルボプラチン注	1 瓶 5 AUC	●
006	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から 7ハースチン投与前フラッシュ 生理食塩液 20ml (20mL/A)	1 A	●
007	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 15mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) アバステイン点滴静注用	1 瓶 15 mg/kg	●