

レジメン : 42014003 大腸-Cmab-1W (初回) /ビラトビ/メトビ 併用
 レジメン期間 : 7 ~ 7日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用/投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ポララミン注 5mg (5mg/1mL/A)	1瓶 4 A 1 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 2時間 400mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) アービタックス	1袋 400 mg/m ²	●

【内服抗がん剤併用】 : ビフラトビ300mg分1/日、メクトビ90mg分2/日 連日服用