

レジメン : 42014011 大腸-Cmab/mFOLFOX6 (初回)
 レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
002	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセト点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ボラミン注5mg (5mg/1mL/A)	1 袋 6 A 1 A	●	
003	点滴中心静脈 投与時間：2時間 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/瓶) アービタックス	1 瓶 400 mg/m ²	●	
004	点滴中心静脈 投与時間：1時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	
005	点滴中心静脈 投与時間：2時間 85mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート ホリナトと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) エルブラット注	1 袋 85 mg/m ²	●	
006	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から エルブラットと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) ホリナト点滴静注用	1 袋 200 mg/m ²	●	
007	点滴中心静脈 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 全開で 主ルート エルブラット終了後 生理食塩液50ml (50mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 400 mg/m ²	●	
008	点滴中心静脈 投与時間：46時間 2400mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザ-ポンプ 生理食塩液100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m ²	●	
009	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘパリナリナドック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 筒	●	
010	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 416 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ボラミン注5mg (5mg/1mL/A)	1 瓶 4 A 1 A	●	
011	点滴中心静脈 投与時間：1時間 250mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/瓶) アービタックス	1 瓶 250 mg/m ²	●	
012	点滴中心静脈 投与時間：30分 一時点滴：1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	