

レジメン : 42011103 大腸-Bev/mXELIRI-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 7.5mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) アバスチン注	1 瓶 7.5 mg/kg	●
003	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から アバスチン投与後フラッシュ用 生理食塩液 20ml (20ml/A)	1 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から ケラセトロンバッグ 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 200mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) トポテシン注	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	●

【内服抗がん剤併用】 : ゼローダ(1600mg/m<sup>2</sup>)分2/日 : Day1~14