

レジメン : 42030005 食道-オプジーボ®/5FU/CDDP-4W
 レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day15
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートブライミング / 投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●					
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 抗がん剤ルートブライミング / 投与後フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶						●
003	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート 開始から12時まで ソルアセットF輸液 (500mL/袋) (ケイーンF)	1 袋	●					
004	点滴末梢 投与時間 : 30分 240mg/Body 一時点滴 : 1日1回 インラインフィルター使用 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) オブジーボ点滴静注	1 袋 240 mg/body	●					●
005	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 投与後フラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●					
006	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 106 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から アロキ点滴静注ハック 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●					
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセットF輸液 (500mL/袋) (ケイーンF)	1 袋	● ●					
008	点滴末梢 投与時間 : 24時間 800mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 24時間 主ルート ピカナイト輸液 (1000ml/袋) フルオロウラシル注	1 袋 800 mg/m ²	●	●	●	●	●	
009	点滴末梢 投与時間 : 2時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 袋 80 mg/m ²	●					
010	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●					