

レジメン : 42040003 隣-FF-naI-IRI-2W

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートブライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 70mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) オニバイド注	1 瓶 70 mg/m ²	●
005	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 全開で 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	● ●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 200mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から オパイト終了後に投与 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) ホホリナート点滴静注用	1 袋 200 mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 投与時間 : 46時間 2400mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザーポンプ 生理食塩液100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m ²	●
008	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 C	●