

レジメン : 42010101 大腸-FOLFIRI-2W

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から ゲラセトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
003	点滴中心静脈 投与時間：2時間 150mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート シホリナートと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) トポテシン注	1 袋 150 mg/m ²	●
004	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から トポテシンと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) シホリナート点滴静注用	1 袋 200 mg/m ²	●
005	点滴中心静脈 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 全開で 主ルート トポテシン終了後 生理食塩液50ml (50mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 400 mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 投与時間：46時間 2400mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザーポンプ 生理食塩液100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 筒	●