

レジメン : 42040002 膝-FOLFIRINOX-2W

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1袋	●
002	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1瓶	●
003	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 70キシ点滴静注パック 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1袋 6A	●
004	点滴末梢 投与時間：2時間 85mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) エルプラット注	1袋 85 mg/m ²	●
005	点滴末梢 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から トポテシンと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) レボネリナト点滴静注用	1袋 200 mg/m ²	●
006	点滴末梢 投与時間：1時間30分 180mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 主ルート レボネリナト開始30分後から 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) トポテシン注	1袋 180 mg/m ²	●
007	点滴末梢 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 主ルート トポテシン終了後全開で 大塚生食注 50mL (50mL/袋) フルオロウラシル注	1袋 400 mg/m ²	●
008	点滴中心静脈 投与時間：46時間 2400mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザーホーン 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1瓶 2400 mg/m ²	●
009	点滴末梢 一時点滴：1日1回 ヘパリンNaロック用 100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1C	●