

レジメン : 42010201 大腸-FOLFOXIRI-2W

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルート <sup>®</sup> ライミカ <sup>®</sup> 用/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から アキシ点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴中心静脈 投与時間：1時間 165mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 主ルート 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) トポテシン注	1 袋 165 mg/m <sup>2</sup>	●
005	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から エルプラットと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) レボリット点滴静注用	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	●
006	点滴中心静脈 投与時間：2時間 85mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート レボリットと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) エルプラット注	1 袋 85 mg/m <sup>2</sup>	●
007	点滴中心静脈 投与時間：46時間 3200mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザーポンプ <sup>®</sup> 生理食塩液100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 3200 mg/m <sup>2</sup>	●
008	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 筒	●