

レジメン : 50010021 頭頸部-キイトルーダ®/CBDCA/5FU-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●			
002	点滴末梢 投与時間 : 30分 200mg/Body 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 216 ml/h インラインフィルター使用 (優先) 投与時間 30分 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●			
003	点滴末梢 投与後フラッシュ用 一時点滴 : 1日1回 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●			
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から アキチ点滴静注バッグ 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●			
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	●			
006	持続点滴末梢 投与時間 : 24時間 1000mg/m <sup>2</sup> 持続点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 24時間 主ルート ビカネイト輸液 (1000ml/袋) フルオロウラシル注	1 袋 1000 mg/m <sup>2</sup>	●	●	●	●