

レジメン : 50010020 頭頸部-キイトルーダ/CDDP/5FU-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●			
002	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート 開始から12時まで ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (G'インF)	1 袋	●			
003	点滴末梢 投与時間：30分 200mg/Body 一時点滴：1日1回 側管から 点滴速度 216 ml/h インラインフィルター使用 (優先) 投与時間 30分 生理食塩液100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●			
004	点滴末梢 投与後フラッシュ用 側管から 一時点滴：1日1回 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●			
005	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル) デキササート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●			
006	点滴末梢 投与時間：1時間45分 一時点滴：1日1回 点滴速度 285.7 ml/h (優先) 投与時間 1時間 45分 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (G'インF)	1 袋	●			
007	点滴末梢 投与時間：2時間 100mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 100 mg/m ²	●			
008	持続点滴末梢 投与時間：24時間 1000mg/m ² 持続点滴：1日1回 (優先) 投与時間 24時間 主ルート ピカネイト輸液 (1000ml/袋) フルオロウラシル注	1 袋 1000 mg/m ²	●	●	●	●
009	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●			
010	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (G'インF)	1 袋	●			