

レジメン : 42021001 胃-HER/S1/CDDP-3W(初回)

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルトブ <sup>®</sup> ライミン <sup>®</sup> 、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルト① ルト確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルト② 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 8mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) 注射用蒸留水 20ml (20mL/A) トラスツズマブ注	1 袋 2 A 8 mg/kg	●
005	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 15分かけて グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ウーイフ)	1 袋	●●
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 60mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 袋 60 mg/m <sup>2</sup>	●
008	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●

【内服抗がん剤併用】 : エスワン(80mg/m<sup>2</sup>)分2/日 : Day1~14