レジメン : 42021005 胃-HER/XEL0X-3W(初回) レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
-	1 2 1 1 1 1 1	议 是	Dayı
001	点滴末梢		
	一時点滴:1日1回		
	主ルート		
	ルート確保/終了時フラッシュ用		
	生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢		
	投与時間:1時間30分		
	8mg/kg		
	一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 1時間 30分		
	側管から、		
	生理食塩液 2 5 0 m l (250mL/瓶)	1 瓶	
	注射用蒸留水 2 0 m l (20mL/A)	2 A	
000	トラスツズマブ注	8 m g/kg	
003	点滴末梢		•
	投与時間:15分		
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 412 ml/h		
	(優先)投与時間 15分		
	側管から	1 4	
	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)	1 袋	
004	デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) 点滴末梢	6 A	
004	投与時間:2時間		
	130mg/m ²		
	一時点滴:1日1回		
	「一日」日 (優先) 投与時間 2時間		
	(優元/) 及子時間 と時間		
	5 %ブドウ糖液(250ml/袋)	1 袋	
	エルプラット注	130 mg/m^2	

【内服抗がん剤併用】:ゼローダ(2000mg/㎡)分 2 /日:Day1~14