

レジメン : 42021003 胃-HER/XP-3W(初回)
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート① ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート② 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●
003	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 8mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) 注射用蒸留水 20ml (20mL/A) トラスツズマブ注	1 瓶 2 A 8 mg/kg	●
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 80 mg/m ²	●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN 3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ウ*イ*ンF)	1 袋	●

【内服抗がん剤併用】 : ゼローダ(2000mg/m²)分2/日 : Day1~14