

レジメン : 27030103 頸-ハイカムチン/GDDP-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3
001	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●		
002	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●		
003	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から アロキ点滴静注 ^{ハッ} 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●		
004	点滴末梢 投与時間：30分 0.75mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) ハイカムチン注	1 瓶 0.75 mg/m ²	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間：1時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/瓶)	1 瓶	●		
006	点滴中心静脈 投与時間：2時間 50mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 50 mg/m ²	●		
007	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●	●	●
008	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ウーイソF)	1 袋	●	●	●
009	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液50mL (50mL/瓶) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 瓶 4 A		●	●