

レジメン : 42040104 胆-キイトルーダ®/GEM/CDDP-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1 袋	●	●
002	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
003	点滴末梢 投与時間：30分 200mg/Body 一時点滴：1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●	
004	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 408 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A	●	●
005	点滴末梢 投与時間：1時間30分 一時点滴：1日1回 主ルート 点滴速度 333.3 ml/h (優先) 投与時間 1時間 30分 ソルアセトF輸液(500mL/袋)(ゲイソF)	1 袋	● ●	● ●
006	点滴末梢 投与時間：1時間 25mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/袋) シスプラチン注	1 袋 25 mg/m ²	●	●
007	点滴末梢 投与時間：30分 1000mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) ゲムシタビン注	1 瓶 1000 mg/m ²	●	●