

レジメン : 41010102 肺S-CBDCA/VP16/イミフィンジ-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 ルート確保/終了時フラッシュ用 主ルート① 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間：1時間 1500mg/Body 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液250ml (250mL/袋) イミフィンジ注	1 袋 1500 mg/body	●		
003	点滴末梢 一時点滴：1日1回 全開で 側管から イミフィンジフラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●		
004	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間：2時間 80~100mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) ラステット注	1 瓶 100 mg/m ²	●	●	●
006	点滴末梢 投与時間：1時間 5~6AUC 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/袋) カルボプラチン注	1 袋 6 AUC	●		