

レジメン : 41010101 肺S-CDDP/VP16/イミフィンジ[®]-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3
001	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●		
002	点滴末梢 投与時間 : 1時間 1500mg/Body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から インラインフィルタ-使用 生理食塩液 250ml (250mL/袋) イミフィンジ注	1 袋 500 mg/body	●		
003	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から 全開で イミフィンジフラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●		
004	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート 投与から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●		
005	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	●	●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 80~100mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) ラステット注	1 瓶 100 mg/m ²	●	●	●
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 75~80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 80 mg/m ²	●		
008	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ランックス)	1 袋 1 A	●	●	●
009	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ガイーンF)	1 袋	●	●	●