

レジメン : 46010116 ML-A+AVD

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day15
001	点滴末梢 6mg/m ² (max10mg) 一時点滴 : 1日1回 全開で 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) エクザール注	1 袋 6 mg/m ²	●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサト注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 8 A	●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 25mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) ドキシソルピシン注	1 瓶 25 mg/m ²	●	●
004	点滴末梢 投与時間 : 5分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 側管から ドキシソルピシン ルートフラッシュ用 ダカルバジン ルートフラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	● ●	● ●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 375mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から ルートも全て遮光して投与 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) 注射用蒸留水20ml (20mL/A) ダカルバジン注	1 瓶 4 A 375 mg/m ²	●	●
006	点滴末梢 投与時間 : 30分 1.2mg/kg (max120mg) 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) 注射用蒸留水20ml (20mL/A) アドセトリス注	1 瓶 2 A 1.2 mg/kg	●	●
007	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋) (カイトル)	1 袋	●	●