

レジメン : 46010112 ML-ABVD

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day15
001	点滴末梢 6mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 全開で 側管から 生理食塩液 50mL (50mL/瓶) エクザール注	1 瓶 6 mg/m <sup>2</sup>	●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から ゲラニトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 8 A	●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 9mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100mL (100mL/瓶) ブレオ注	1 瓶 9 mg/m <sup>2</sup>	●	●
004	点滴末梢 投与時間 : 30分 25mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100mL (100mL/瓶) ドキシルビシン注	1 瓶 25 mg/m <sup>2</sup>	●	●
005	点滴末梢 投与時間 : 5分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 側管から ドキシルビシン ルートフラッシュ用 生理食塩液 50mL (50mL/瓶)	1 瓶	●	●
006	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 375mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から ルートも全て遮光して投与 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) 注射用蒸留水 20mL (20mL/A) ダカルバジン注	1 瓶 4 A 375 mg/m <sup>2</sup>	●	●
007	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から ゲラニトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋)	1 袋	●	●