

レジメン : 46010202 ML-GCD-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 220 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) オルガドロン注射液19mg (19mg/5mL/V)	1 袋 2 瓶	●	
002	点滴末梢 投与時間 : 30分 1000mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液1000ml (100mL/瓶) ゲムシタビン注	1 瓶 1000 mg/m ²	●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 5分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 側管から ゲムシタビン フラッシュ用 カルプロチン フラッシュ用 生理食塩液500ml (50mL/瓶)	1 瓶	●	●
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/瓶) カルプロチン注	1 瓶 5 AUC	●	
005	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)	1 袋		●

【内服併用】デキサメタゾン最大40mg/日 Day2~4(3日間)