

レジメン : 46010300 ML-増量BEACOPP-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day8
001	点滴末梢 投与時間: 15分 一時点滴: 1日1回 点滴速度 400 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)	1 袋	●	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間: 30分 35mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 大塚生食注50mL(50mL/袋) ドキシソルビシン注	1 袋 35 mg/m ²	●			
003	点滴末梢 投与時間: 5分 一時点滴: 1日1回 側管から ドキシソルビシン ルートフラッシュ用 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 ラステット ルートフラッシュ用 フラッシュ用 大塚生食注50mL(50mL/袋)	1 袋	●	●	●	●
004	点滴末梢 投与時間: 1時間 1250mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液500ml(点滴・静注)(500mL/袋) エンドキサン注	1 袋 1250 mg/m ²	●			
005	点滴末梢 投与時間: 2時間 100mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液(500mL/瓶) ラステット注	1 瓶 100 mg/m ²	● ●	● ●	● ●	
006	点滴末梢 1.4mg/m ² Max 2mgまで 一時点滴: 1日1回 側管から 全開で 大塚生食注50mL(50mL/袋) オンコピン注	1 袋 1.4 mg/m ²				●
007	点滴末梢 投与時間: 30分 10mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から Max15mgまで 生理食塩液100ml(100mL/瓶) ブレオ注	1 瓶 10 mg/m ²				●

【内服併用】 プレドニゾロン(40mg/m²): day1~14、プロカルバジン(100mg/m² 分3): day1~7