

レジメン : 46010051 ML-Pola-R-CHP-3W (2~6日目)

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート、ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
002	点滴末梢 375mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 50ml/h r で開始、以降の指示は医師の指示どおり 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) リゾキシマブ注	1 瓶 375 mg/m ²	●	
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 1.8mg/Kg 一時点滴 : 1日1回 インラインフィルター使用 希釈後濃度が0.72~2.7mg/mlになるように調製 側管から (優先) 投与時間 30分 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) 注射用蒸留水 20ml (20mL/A) ボライビー点滴静注用	1 瓶 1 A 1.8 mg/kg		●
004	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 側管から 経過観察用 忍容性があれば30分に短縮可 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶		●
005	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 400 ml/h (優先) 投与時間 15分 グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル)	1 袋		●
006	点滴末梢 投与時間 : 30分 50mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) ドキシルビシン注	1 袋 50 mg/m ²		●
007	点滴末梢 投与時間 : 5分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 側管から ドキシルビシン ルートフラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋		●
008	点滴末梢 投与時間 : 2時間 750mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) エンドキサン注	1 瓶 750 mg/m ²		●

【内服併用】プレドニゾン最大100mg/日 Day2-6 (5日間)