

レジメン : 42040001 膝-nabPTX/GEM-4W

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 ルート確保用 主ルート 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●	●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	●	●
004	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から アブラキサン投与前フラッシュ 生理食塩液 20ml (20ml/A)	1 A	●	●	●
005	点滴中心静脈 投与時間 : 30分 125mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) アブラキサン注	1 瓶 125 mg/m ²	●	●	●
006	点滴末梢 投与時間 : 30分 1000mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) ゲムシタビン注	1 袋 1000 mg/m ²	●	●	●