

レジメン : 13010332 乳- (NAC) キイトルーダ[®]/AC-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 200mg/Body 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 インラインフィルター使用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から アキチ点滴静注バッグ 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴末梢 60mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 全開で 側管から 大塚生食注 50mL (50mL/袋) ドキシソルビシン注	1 袋 60 mg/m ²	●
006	点滴末梢 投与時間 : 30分 600mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) エンドキサン注	1 瓶 600 mg/m ²	●