

レジメン : 13010330 乳- (NAC) キイトルーダ®/wPTX/qwCBDCA-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

| RpNo. | 手技/薬品/コメント | 設定量 | Day1 | Day8 | Day15 |
|-------|--|-----------------------------|------|------|-------|
| 001 | 点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートブライミング用/投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋) | 1 袋 | ● | | |
| 002 | 点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 抗がん剤ルートブライミング用/投与後フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) | 1 瓶 | ● | ● | ● |
| 003 | 点滴末梢 投与時間 : 30分 200mg/body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注 | 1 瓶 200 mg/body | ● | | |
| 004 | 点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 288 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 70キ点滴静注パック 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注 20mg (20mg/20mL/A) (カスター) | 1 袋 4 A 1 A | ● | | |
| 005 | 点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) | 1 瓶 | ● | ● | ● |
| 006 | 点滴末梢 投与時間 : 1時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) バクリタキセル注 | 1 袋 80 mg/m ² | ● | ● | ● |
| 007 | 点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 側管から (優先) 投与時間 1時間 生理食塩液 250ml (250mL/袋) 加ホフラン注 | 1 袋 5 AUC | ● | | |
| 008 | 点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 288 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注 50mL (50mL/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注 20mg (20mg/20mL/A) (カスター) | 1 袋 4 A 1 A | | ● | ● |