

レジメン : 4202009 胃-オプジーホ®/mFOLFOX6 (経口困難)

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルトゾラミン、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 240mg/body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インフュージョン-使用 大塚生食注50mL (50mL/袋) オブジーボ点滴静注	1 袋 240 mg/body	●
004	点滴中心静脈 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴中心静脈 投与時間 : 2時間 85mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート レボネオナトと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) エルブラット注	1 袋 85 mg/m <sup>2</sup>	●
006	点滴中心静脈 投与時間 : 2時間 200mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から エルブラットと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) レボネオナト点滴静注用	1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>	●
007	点滴中心静脈 400mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 全開で 主ルート エルブラット終了後 大塚生食注50mL (50mL/袋) フルオロウラシル注	1 袋 400 mg/m <sup>2</sup>	●
008	点滴中心静脈 投与時間 : 46時間 2400mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフュージョン-ホップ 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m <sup>2</sup>	●
009	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 筒	●