

レジメン : 42020008 胃-オプジーボ®/XELOX-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 360mg/body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 大塚生食注50mL (50mL/袋) オプジーボ点滴静注	1 袋 360 mg/body	●
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 130mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) エルプラット注	1 袋 130 mg/m <sup>2</sup>	●

【内服抗がん剤併用】 : ゼローダ(2000mg/m<sup>2</sup>)分 2/日 : Day1~14