

レジメン : 41020501 肺NS-CDDP/NVB-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
002	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●	
003	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 側管から (優先) 点滴速度 212 ml/h 投与時間 15分 70%点滴静注パック0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	
004	点滴末梢 投与時間：7分 25mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 7分 側管から 医師立ち会いで投与 大塚生食注50mL (50mL/袋) ナベルピン注	1 袋 25 mg/m ²	●	●
005	点滴末梢 一時点滴：1日1回 全開で 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
006	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ヴァインF)	1 袋	●	
007	点滴末梢 投与時間：2時間 80mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 80 mg/m ²	●	
008	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●	
009	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 瓶 4 A		●