

レジメン : 41020500 肺NS-CDDP/PEM-3W  
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 アロキ点滴静注パック 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 10分 500mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 10分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) アリムタ注射用	1 瓶 500 mg/m <sup>2</sup>	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ウーイフ)	1 袋	● ●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 75mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 75 mg/m <sup>2</sup>	●
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●