

レジメン : 41020006 肺NS-オブジーホー/ヤーボイ/CBDCA/PTX-6W
 レジメン期間 : 42 ~ 42日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day22
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●
002	点滴末梢 投与時間：30分 360mg/body 一時点滴：1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 大塚生食注50mL (50mL/袋) オブジーボ点滴静注	1 袋 360 mg/body	●	●
003	点滴末梢 投与時間：30分 一時点滴：1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 経過観察、フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	
004	点滴末梢 投与時間：30分 1mg/kg 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 およそ1~4mg/mlの濃度になるように調整 大塚生食注50mL (50mL/袋) ヤーボイ点滴静注液	0.7 袋 1 mg/kg	●	
005	点滴末梢 一時点滴：1日1回 全開で 側管から フラッシュ用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1 袋	●	●
006	点滴末梢 一時点滴：1日1回 全開で 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 袋 10 A 1 A	●	●
007	点滴末梢 投与時間：30分 一時点滴：1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトリル)	1 袋	●	●
008	点滴末梢 投与時間：3時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) バクリタキセル注	1 瓶 200 mg/m ²	●	●
009	点滴末梢 投与時間：1時間 6AUC 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) カルボプラチン注	1 袋 6 AUC	●	●