

レジメン : 41020002 肺NS-キイトルーダ*/CBDCA/nabPTX-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 ルート確保/終了時フラッシュ用 主ルート① 生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間：30分 200mg/Body 一時点滴：1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先)投与時間 30分 インラインフィルター使用 側管から 生理食塩液100ml(100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●		
003	点滴末梢 一時点滴：1日1回 キイトルーダ投与後フラッシュ 全開で 側管から アブラキサン投与後フラッシュ 全開で 大塚生食注50mL(50mL/袋)	1 袋	● ●	●	●
004	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先)投与時間 15分 側管から 70キシ点滴静注パック0.75mg(0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg(1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A	●		
005	静脈内注射 静脈注射：1日1回 アブラキサン投与前フラッシュ 生理食塩液20ml(20ml/A)	1 A	●	●	●
006	点滴末梢 投与時間：30分 100mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml(100mL/瓶) アブラキサン注	1 瓶 100 mg/m ²	●	●	●
007	点滴末梢 投与時間：1時間 6AUC 一時点滴：1日1回 (優先)投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml(250mL/袋) カルボフラチン注	1 袋 6 AUC	●		
008	点滴末梢 一時点滴：1日1回 全開で 側管から 大塚生食注50mL(50mL/袋) デキサート注射液1.65mg(1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A		●	●