

レジメン : 13010304 乳-キイトルーダ®/GEM/CBDCA-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

| RpNo. | 手技/薬品/コメント | 設定量 | Day1 | Day8 |
|-------|---|------------------------------|------|------|
| 001 | 点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルトプラミン®用/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋) | 1袋 | ● | ● |
| 002 | 点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルト ルト確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶) | 1瓶 | ● | ● |
| 003 | 点滴末梢 投与時間 : 30分 200mg/Body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 インラインフィルター使用 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注 | 1瓶 200 mg/body | ● | |
| 004 | 点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 408 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) | 1袋 4A | ● | ● |
| 005 | 点滴末梢 投与時間 : 30分 1000mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) ゲムシタビン注 | 1瓶 1000 mg/m ² | ● | ● |
| 006 | 点滴末梢 投与時間 : 1時間 2AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/袋) カルプラチン注 | 1袋 2 AUC | ● | ● |