

レジメン : 13010303 乳-キイトルーダ®/nabPTX
 レジメン期間 : 84 ~ 84日

| RpNo. | 手技/薬品/コメント | 設定量 | Day1 | Day8 | Day15 | Day22 | Day29 | Day36 | Day43 | Day57 | Day64 | Day71 |
|-------|--|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 001 | 点滴末梢 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルトプラミン ^g 用/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋) | 1 袋 | ● | | | | | | ● | | ● | |
| 002 | 点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルト ルト確保用 抗がん剤ルトプラミン ^g 用/投与後フラッシュ用 生理食塩液100ml (100mL/瓶) | 1 瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 003 | 点滴末梢 投与時間：30分 200mg/body 一時点滴：1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注 | 1 瓶 200 mg/body | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| 004 | 点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) | 1 袋 4 A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 005 | 点滴末梢 一時点滴：1日1回 側管から 77 ^g キヤン投与前フラッシュ 生理食塩液20ml (20ml/A) | 1 A | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 006 | 点滴末梢 投与時間：30分 100mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶) アブラキサン注 | 1 瓶 100 mg/m ² | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 007 | 点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルト ルト確保用 大塚生食注50mL (50mL/袋) | 1 袋 | | | | ● | | | | | | |