

レジメン : 13010302 乳-キイトルーダ®/PTX
 レジメン期間 : 84 ~ 84日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day57	Day64	Day71
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルトブ®ライミング®用/投与後フラッシュ用 生理食塩液250ml (250mL/袋)	1袋	●						●		●	
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 抗がん剤ルトブ®ライミング®用/投与後フラッシュ用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1瓶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 200mg/body 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から インフィルタ-使用 生理食塩液100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1瓶 200 mg/body	●			●			●		●	
004	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 288 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1袋 4 A 1 A	●	●	●		●	●	●	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1瓶	●	●	●		●	●	●	●	●	●
006	点滴末梢 投与時間 : 1時間 90mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/袋) パクリタキセル注	1袋 90 mg/m ²	●	●	●		●	●	●	●	●	●
007	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 大塚生食注50mL (50mL/袋)	1袋				●						