

レジメン : 42030008 食道-キイトルーダ[®]/5FU/CDDP-3W (1~6コース)

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
001	点滴末梢 抗がん剤ルートプライミング/投与後フラッシュ用 一時点滴: 1日1回 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●				
002	点滴末梢 一時点滴: 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●				
003	点滴末梢 一時点滴: 1日1回 主ルート 開始から12時まで ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ガーインF)	1 袋	●				
004	点滴末梢 投与時間: 1時間 200mg/Body 一時点滴: 1日1回 点滴速度 108 ml/h (優先) 投与時間 1時間 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●				
005	点滴末梢 投与時間: 30分 一時点滴: 1日1回 点滴速度 106 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 7mg点滴静注パツク [®] 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●				
006	点滴末梢 投与時間: 2時間 一時点滴: 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ガーインF)	1 袋	● ●				
007	点滴末梢 投与時間: 24時間 800mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 24時間 主ルート ピカネイト輸液 (1000ml/袋) フルオロウラシル注	1 袋 800 mg/m ²	●	●	●	●	●
008	点滴末梢 投与時間: 2時間 80mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 袋 80 mg/m ²	●				
009	点滴末梢 投与時間: 2時間 一時点滴: 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●				