

レジメン : 27030102 頸-PTX/CDDP-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100ml/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 袋 10 A 1 A	●
003	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●
004	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 70キ点滴静注パッグ 0.75mg (0.75mg/50ml/袋)	1 袋	●
005	点滴末梢 投与時間 : 3時間 175mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) パクリタキセル注	1 瓶 175 mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 投与時間 : 2時間 50mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 50 mg/m ²	●
007	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋)	1 袋	●
008	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ウインF)	1 袋	●