

レジメン : 42012001 大腸-RAM/FOLFIRI-2W (初回)

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴中心静脈 投与時間：1時間 8mg/kg 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から インラインフィルター使用 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) サイラムザ	1 瓶 8 mg/kg	●
003	点滴中心静脈 投与時間：1時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
004	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
005	点滴中心静脈 投与時間：2時間 150mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート レボチンと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) トボテンシ注	1 袋 150 mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から トボテンシと同時に 5%ブドウ糖液(250ml/袋) レボチン点滴静注用	1 袋 200 mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 全開で 主ルート トボテンシ終了後 生理食塩液 50ml (50mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 400 mg/m ²	●
008	点滴中心静脈 投与時間：46時間 2400mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザーポンプ 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m ²	●
009	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 筒	●