

レジメン : 42020006 胃-mFOLFOX6-2W (経口困難)

レジメン期間 : 14 ~ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルート ^ア ライミン ^ク 、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
002	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
003	点滴中心静脈 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴中心静脈 投与時間 : 2時間 85mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 主ルート レ ^ク リナートと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) エルプラット注	1 袋 85 mg/m ²	●
005	点滴中心静脈 投与時間 : 2時間 200mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から エルプラットと同時に 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) レ ^ク リナート点滴静注用	1 袋 200 mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 400mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 全開で 主ルート エルプラット終了後 大塚生食注 50mL (50mL/袋) フルオロウラシル注	1 袋 400 mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 投与時間 : 46時間 2400mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 46時間 主ルート インフューザ ^ホ ン ^フ 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) フルオロウラシル注	1 瓶 2400 mg/m ²	●
008	点滴中心静脈 一時点滴 : 1日1回 ヘ ^ク リンNa ^ク 用100単位/mLシリンジ ^ク (500単位/5mL)	1 筒	●