

レジメン：42020012 胃-ヒﾟロイ/mFOLF0X6-2W（初回）
レジメン期間：14 ～ 14日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 抗がん剤ルトブﾟライミン、ﾟ投与後フラッシュ用 主ルト ルト確保用 生理食塩液250ml（250mL/袋）	1袋	● ●
002	点滴中心静脈 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 216 ml/h （優先）投与時間 15分 側管から パﾟロセト点点滴静注パﾟツ0.75mg/50mL/袋（アﾟキシ） デキサート注射液1.65mg（1.65mg/0.5mL/A） ボラミン注5mg（5mg/1mL/A）	1袋 6A 1A	●
003	点滴末梢 800mg/m ² 調製後の濃度が2mg/mlになるように調製 一時点滴：1日1回 側管から 投与速度は手順書を確認 インラインフィルター使用 生理食塩液500ml（点滴・静注）（500mL/袋） 生理食塩液100ml（100mL/瓶） 大塚蒸留水100ml（100ml/瓶） ビロイ注	1瓶 1瓶 1瓶 800mg/m ²	●
004	点滴中心静脈 投与時間：2時間 85mg/m ² 一時点滴：1日1回 （優先）投与時間 2時間 主ルト レﾟネリナートと同時に 5%ブドウ糖液（250ml/袋） オキサリプラチン注	1袋 85mg/m ²	●
005	点滴中心静脈 投与時間：2時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 （優先）投与時間 2時間 側管から エルブﾟラットと同時に 5%ブドウ糖液（250ml/袋） レﾟネリナート点滴静注用	1袋 200mg/m ²	●
006	点滴中心静脈 400mg/m ² 一時点滴：1日1回 全開で 主ルト エルブﾟラット終了後 大塚生食注50mL（50mL/袋） フルオロウラシル注	1袋 400mg/m ²	●
007	点滴中心静脈 投与時間：46時間 2400mg/m ² 一時点滴：1日1回 （優先）投与時間 46時間 主ルト インフュサｰホﾟン 生理食塩液100ml（100mL/瓶） フルオロウラシル注	1瓶 2400mg/m ²	●
008	点滴中心静脈 一時点滴：1日1回 ヘﾟリンNa点点滴用100単位/mLシリシﾟ（500単位/5mL）	1筒	●