

レジメン : 42020010 胃-ヒドイ/XELOX-3W(初回)
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング、投与後フラッシュ用 主ルート ルート確保用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	● ●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から パロセトンの点滴静注パック 0.75mg/50mL/袋 (70キ) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ポララミン注 5mg (5mg/1mL/A)	1 袋 6 A 1 A	●
003	点滴末梢 800mg/m ² 調製後の濃度が2mg/mlになるように調製 一時点滴 : 1日1回 側管から 投与速度は手順書を確認 インラインフィルター必要 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) 大塚蒸留水 100ml (100ml/瓶) ビロイ注	1 袋 1 瓶 1 瓶 800 mg/m ²	●
004	点滴末梢 投与時間 : 2時間 130mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) オキサリプラチン注	1 袋 130 mg/m ²	●

【内服抗がん剤併用】 : カペシタビン (2000mg/m²) 分2/日 : Day1~14