

レジメン : 42020020 胃-キイトルーダ®/SOX-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

| RpNo. | 手技/薬品/コメント   | 設定量                          | Day1 |
|-------|--|------------------------------|------|
| 001   | 点滴末梢<br>一時点滴 : 1日1回<br>抗がん剤ルトプラミン®、投与後フラッシュ用<br>生理食塩液 250ml (250mL/袋)  | 1 袋                          | ●    |
| 002   | 点滴末梢<br>一時点滴 : 1日1回<br>主ルト<br>ルト確保用<br>生理食塩液 100ml (100mL/瓶)   | 1 瓶                          | ●    |
| 003   | 点滴末梢<br>投与時間 : 30分<br>200mg/Body<br>一時点滴 : 1日1回<br>点滴速度 216 ml/h<br>(優先) 投与時間 30分<br>側管から<br>インラインフィルター使用<br>生理食塩液 100ml (100mL/瓶)<br>キイトルーダ注        | 1 瓶<br>200 mg/body           | ●    |
| 004   | 点滴末梢<br>投与時間 : 15分<br>一時点滴 : 1日1回<br>点滴速度 412 ml/h<br>(優先) 投与時間 15分<br>側管から<br>グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)<br>デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) | 1 袋<br>6 A                   | ●    |
| 005   | 点滴末梢<br>投与時間 : 2時間<br>100mg/m <sup>2</sup><br>一時点滴 : 1日1回<br>(優先) 投与時間 2時間<br>側管から<br>5%ブドウ糖液(250ml/袋)<br>オキサリプラチン注                                  | 1 袋<br>100 mg/m <sup>2</sup> | ●    |

【内服抗がん剤併用】 : エスワン (80mg/m<sup>2</sup>) 分2/日 : Day1~14