

レジメン : 24010004 UC-GEM/CBDCA-4W

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day8	Day15
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用/投与後フラッシュ用 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A	●		●	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 1000mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) ゲムシタビン注	1 袋 1000 mg/m ²	●		●	●
004	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルートロック用 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ (500単位/5mL)	1 C	●			
005	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カイトル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A		●		
006	点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) カルプラチン注	1 袋 5 AUC		●		