

レジメン : 27020003 体-dose dence TC-4W
 レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 292 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液50ml (50mL/瓶) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 瓶 6 A 1 A	●		
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カトリル)	1 袋	●		
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 5%ブドウ糖液 (250ml/袋) パクリタキセル注	1 袋 80 mg/m ²	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 6AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液250ml (250mL/瓶) カルシウム注	1 瓶 6 AUC	●		
006	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 292 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液50ml (50mL/瓶) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 瓶 4 A 1 A		●	●
007	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶		●	●