

レジメン : 24010008 UTUC-adjvant-GC-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	点滴末梢 投与時間: 1時間 一時点滴: 1日1回 点滴速度 500 ml/h (優先) 投与時間 1時間 主ルート ルート確保用 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋)	1 袋	●	
002	点滴末梢 一時点滴: 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●	
003	点滴末梢 投与時間: 30分 一時点滴: 1日1回 点滴速度 106 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 70μ点滴静注バッグ 0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	
004	点滴末梢 投与時間: 30分 1000mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 1000mg/m ² 生理食塩液 250ml (250mL/袋) ゲムシタビン注	1 袋 1000 mg/m ²	●	●
005	点滴末梢 投与時間: 2時間 70mg/m ² 一時点滴: 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 70 mg/m ²	●	
006	点滴末梢 一時点滴: 1日1回 主ルート ルート確保用 抗がん剤ルートプライミング用、投与後フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶		●
007	点滴末梢 投与時間: 15分 一時点滴: 1日1回 点滴速度 208 ml/h (優先) 投与時間 15分 大塚生食注 50mL (50mL/袋) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A		●