

レジメン : 42020005 胃-XP-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート① ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート② 開始から24時まで ビカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から ケラセトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキササート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ガイーンF)	1 袋	●●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 80 mg/m ²	●
006	点滴末梢 投与時間 : 2時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液 20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●

【内服抗がん剤併用】 : ゼローダ(2000mg/m²)分2/日 : Day1~14